

AZ ARTIFLEXIL EGY ÍZÜLETEK SZERKEZETÉT ÉS MŰKÖDÉSÉT TÁMOGATÓ,
TERMÉSZETES HATÓANYAGOKAT TARTALMAZÓ KOMPLEX
ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐ, A DEGENERATÍV ÍZÜLETI BÁNTALMAK MEGELŐZÉSÉRE,
AZ ÍZÜLETI GYULLADÁS ÉS FÁJDALOM ENYHÍTÉSÉRE. 15 DB. 10 ML-ES
IVÓAMPULLÁBA KISZERELVE.

Mit tartalmaz az ARTIFLEXIL? A napi fogyasztásra javasolt
adag (10 ml) 500 mg halkollagént, 250 mg metil-szulfonil-
metánt (MSM), 100 mg C-vitamint, 100 mg glükózamint, 5
mg hialuronsavat és 2,5 mg kvercetin tartalmaz.

1. Hogyan hat az ARTIFLEXIL?

A kollagén az emberi szervezet kötőszöveteiben mindenhol
jelen levő alapanyag. A porcokon kívül ez alkotja a bőr vázát,
haját és körmöket, ínszalagokat, artériák falát, ez rögzíti a fogakat az ínyben, stb. Mivel a
csontképződéshez egy porc
alapú „öntőforma” szükséges, az egészséges csontképződéshez is elengedhetetlen. A kollagén egy
szálas szerkezetű
fehérje, amit aminosavak építenek fel. Szerkezet alapján 25 féle kollagént ismerünk. Kollagén
fogyasztásával
biztosíthatjuk a porcok, ízületi felszínek regenerációjához szükséges alapanyagot 1 . A kollagénpótlás
igazolt helyet
kapott a degeneratív ízületi megbetegedések kiegészítő terápiájában 2 . A C-vitamin számos egyéb
funkciója mellett a
saját kollagénünk előállításához szükséges, hiányában két alapvető aminosav a prolin és lizin nem
képes a kollagénbe
beépülni. Így sérült, élettani feladatát ellátni képtelen kollagén és porc 3 képződik. Ezen túlmenően
vízoldékony
antioxidánsként véd a szabadgyökök kémiai károsító hatása ellen 4 . Számos ízületi degeneratív
folyamat a
szabadgyökök által okozott mikroszkópikus sérülésekkel lobban be. A C-vitamin továbbá elősegíti a
kvercetin
felszívódását is. Ami egy bioflavonoidok csoportjába tartozó olyan antioxidáns, ami az ARTIFLEXILben
viszont erősíti és
kiegészíti a C-vitamin antioxidáns védőhatását. Az antioxidánsok minden sejt- és szövetféleséget
védenek a
szabadgyökök károsító hatása ellen, így az ízületi porcot is. Az MSM (metil-szulfonil-metán) egy
kénszállító
molekula. Jelentős mennyiségben van jelen az emberi és állati szervezetekben, ugyanis a kötőszöveti
elemekben kén
szolgáltatja keményen rugalmas kötéseket. Hiányában zavart szenved a porcépítés, a porc
regenerálódás.
Tanulmányok igazolják gyulladásgátló hatását, ezáltal fájdalomcsillapító hatását ízületi
gyulladásokban 5 . A
glükózamin nitrogéntartalmú szénhidrát, a kötőszövetek rugalmasságát és vízmegkötő képessége
révén azok
hidratáltságát biztosítja. Mivel azonban a porcszöveteknek nincs érhálózata, a glükózamin a

porcszövet táplálásában

és anyagcseréjében is nélkülözhetetlen. Humán vizsgálatok igazolják, hogy hosszú távú alkalmazása mellékhatások

nélkül csökkenti artrózisos betegek ízületi fájdalmát 6 . A hialuronsav szintén egy nagy molekulájú szénhidrát, nagy

vízköltő képességgel. Számos szövetben és szervben jelen van (szem, bőr, csontok, porcok, ízületek).

Az ízületi

porcokban és hártyákban, mint kenőanyagot ismerjük 7 . Ezzel meghosszabbítja az ízületek ép működésének

időtartamát és csökkenti a fájdalmat, gyulladást 8 . Bár az általános gyakorlat szerint a hialuronsavat leginkább

közvetlenül az ízületbe való beinjekciózással alkalmazzák, egy placebo kontrollált, kettős vak klinikai vizsgálat

eredménye szerint szájon át való alkalmazása 2 hónapon át, szintén hatásosnak bizonyult 9 . Az emberi szervezetben

élettartama mindössze néhány nap, ezt követően új hialuronsavnak kell beépülnie. Megállapítást nyert, hogy a kor

előrehaladtával testünk hialuronsav regenerációja egyre csökken, ami azonban pótolható.

Reumatológiai és

ortopédiai felhasználásán kívül alkalmazzák a kozmetikában, bőrgyógyászatban, szemsebészetben, urológiában és

orr-fül-gégészetben is. A hialuronsav kutatásnak egyik vezéregyénisége egy magyar kutató, Dr. Balázs Endre (1920-

2015) 10 volt, aki már 1942-ben szabadalmaztatta.

Az ARTIFLEXIL hatóanyagai egymást erősítve hozzájárulnak az egészséges porcszövetképződéshez és regenerációhoz, az

ízületi porcok táplálásához és anyagcseréjéhez, antioxidáns összetevőkkel védik az ízületeket 11 a degeneratív

folyamatoktól, illetve gyulladásgátló-fájdalomcsillapító hatással enyhítik a panaszokat.

2. Kinek javasolható az ARTIFLEXIL?

Összetevőinek szinergista, egymás hatásait kiegészítő és erősítő hatásainak hála, az ARTIFLEXIL különösen alkalmas az

ízületi degeneratív (sokzületi reuma, osteoartrózisok) betegségek kockázatával élő egyének számára megelőzés

céljára, már fiatalabb korban is. Ahogyan ízületeiket megterhelő sportolók és nehéz fizikai munkát végző egyének

számára 12 is. Már kialakult ízületi betegségben az állapotromlás lassítása, a fájdalmas és gyulladásos panaszok

enyhítésére alkalmas.

3. Az ARTIFLEXIL alkalmazása és adagolása.

Napi 1 ivóampulla tartalmát keverje el egy adagnyi tetszőleges folyadékban (ivóvíz, gyümölcslé, tea, joghurt, stb.).

Lehetőleg étkezés közben vagy étkezés után fogyassza. Ne keverje alkoholos vagy magas koffeintartalmú italokba.

Bármely napszakban fogyasztható, de célszerű naponta kb. ugyanabban az időszakban.
A javasolt napi adagot ne lépje túl!

4. Az ARTIFLEXIL tárolása.

A készítmény hőtől, napsugárzástól védett helyen szoba hőn tárolható saját csomagolásában.
Felhasználható a csomagoláson feltüntetett lejárat határidőig. A felbontott ivóampulla tartalma nem tárolható, azonnal meg kell inni.
Gyermekek elől elzárva tartandó.

5. Lehetséges mellékhatások és figyelmeztetések.

Az ARTIFLEX biztonságosan fogyasztható az előírások betartása mellett 4, 13 . Mellékhatásokat nem ismerünk. Halakra, tenger gyümölcseire allergiás egyéneknek fogyasztása nem javasolt. Várandós anyáknak ismeretek hiányában nem javasolt. Előrehaladott veseelégtelenségben csak kezelőorvos javaslati alapján szedhető.
A készítmény nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és egészséges életmódot. Nem helyettesíti a szakorvosi ellátást és gondozást.